

Informações sobre o câncer de bexiga

Dados mundiais

O câncer de bexiga é o

10.º câncer mais comum¹

É a **13.ª** principal causa de morte relacionada ao câncer¹

Os números mais recentes mostram

549.393 NOVOS CASOS diagnosticados e


199.922 MORTES apenas em 2018¹

Mais de **60% dos casos** e **50% de todas as mortes** ocorrem em países menos desenvolvidos²

■ NOVOS CASOS EM 2018¹ ■ MORTES EM 2018¹

América do Norte
91.689
20.227

No mundo **549.393** **199.922**



Sintomas principais



Sangue na urina³



Micção frequente ou dor ao urinar^{3,4}



Dor abdominal, lombar e pélvica^{3,4}



Repetidas infecções do trato urinário⁴



Incontinência⁴



Cansaço⁴



Perda de peso⁴

FONTES:

1. International Agency for Research on Cancer (IARC). 2018. Bladder. Online 2. Antoni S, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. 2017. Bladder Cancer Incidence and Mortality: A Global Overview and Recent Trends. European Urology 71(1): 96-108 3. Mayo Clinic. 2019. Bladder cancer. Disponível em: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bladder-cancer/symptoms-causes/syc-20356104> 4. Fight Bladder Cancer. 2020. Sintomas.

Principais causas



Fumar ou outras formas de uso do tabaco³



Prévia exposição à radiação³



Inflamação crônica da bexiga³



Exposição a produtos químicos, principalmente no trabalho³



Infecções parasitárias³

Nem sempre é claro o que causa o câncer de bexiga e algumas pessoas podem ser diagnosticadas sem terem sido expostas a nenhuma das causas aqui listadas.